

Kert- és parkvédelmi módok

Hogyan védekezünk a rongálók ellen?

Jogi védelem – büntetés – hiányában műszaki megoldásokkal kell parkterületek védelméről gondoskodni.

- A megközelítést is lehetetlenné teszi a megbonthatatlan, átmászhatatlan vaskerítés, amit drágasága miatt csak különösen fontos helyeken lehet megvalósítani. Ekkor viszont stílusában összhangban legyen az óvott tárggyal, s annak mintegy kiterjesztéseként, növelje az értékét.
- A 60–80 cm magas kőfallal körülvett kiemelt terület elsősorban az átjárás ellen hasznos.
- Nyírott sövény, szűrős cserjeféleségekből – borbolyák, tűztövis, kökény, narancseper, lepényfa - a legolcsóbb, legtermészetesebb, de védőhatását több év alatt éri el.
- Botanikailag értékes cserjénél és fánál, ahol a növény megléte az elsődleges, és külalak szempontjából engedmény tehető, a növény szándékos elcsúfításával, félremetszéssel védekezhetünk. Ekkor értelmetlen ellopni, mert torz alakja miatt használhatatlan. Később, ha csúnyaságát kinőtte, már mérete biztosíték a megmaradására.
- Ne ültessünk könnyen áttelepíthető palántákat – ageratum, begonia, paprikavirág stb.- és vágási célra jó, virágzó fajokat, örökzöldeket, pl. nemes rózsza, teltvirágú orgona, jezsámen stb. illetve tuját, hamisciprust és társaikat.
- Karácsony előtt veszélyeztetett fenyőinket ideiglenes elcsúfítással óvhatjuk. A mésztejes, sáros leöntés ezeket díszítésre alkalmatlanná teszi.
- Cserjéket és fákat nem tudnak tövestől elvinni, ha azok gyökere illetve földlabdája súlyozott. A szokásosnál mélyebbre ültetett növények gyökerére, földlabdájára két oldalról deszkákat (építkezésnél bontott anyagból!) teszünk, s ezt 20 cm vastag földdel takarjuk. A deszka legalább 1 méter hosszú legyen, de még biztosabb, ha két szomszédos növényt két-két deszkával kötünk össze. Így a pallókon olyan súlyú föld lesz, amitől a növényt kilátástalan tövestől kiemelni. A szorosan a tőhöz tett palló nem árt a növénynek, mert mire növekedésében akadályozná, elkorhad, hasznos fafölddé válik.
- Üvegházi növényeket – leander, angyaltrombita, pálmák stb. – az előbbihez hasonlóan lehet kezelni, de edényestől süllyesztjük ki azokat. Ősszel a deszkanehezéket levéve fagymentes helyen telettethetők.
- Lopások zömében hét végi pihenőnapokon történnek. Célszerű szervezéssel az árasztásos öntözés péntekre időzíthető, és akkor a sárossá tett felszín akadályozza a növények megközelítését.

Budapest, 2007. június 28.

Pesti László